BEHANDELING BLOEDDRUK (kwetsbare) OUDEREN

OUDEREN

70+ JAAR

KWETSBAAR

MET HVZ

Starten
Aanbevolen bij SBD > 160 mmHg en voldoende levensverwachting.

Streefwaarde
SBD < 150 mmHg, voorzichtig titreren!
Verlaag dosering bij DBD < 70 mmHg, ongeacht hoogte SBD.

Stoppen
Laagdrempelig stoppen bij bijwerkingen of geringe levensverwachting.

GEEN HVZ

Starten
Overwegen bij SBD > 160 mmHg en voldoende levensverwachting.

Streefwaarde
SBD < 150 mmHg.
Verlaag dosering bij DBD < 70 mmHg, ongeacht hoogte SBD.

Stoppen
Laagdrempelig stoppen bij bijwerkingen of geringe levensverwachting.

Niet KWETSBAAR

MET HVZ

Starten
Aanbevolen bij SBD > 160 mmHg.

Streefwaarde
SBD < 150 mmHg.
Overweeg, bij geen bijwerkingen: SBD < 140 mmHg.

Stoppen
Stop niet,
tenzij hinderlijke bijwerkingen.

GEEN HVZ

Starten
Overwegen bij SBD > 160 mmHg.

Streefwaarde
SBD < 150 mmHg.
Overweeg, bij geen bijwerkingen: SBD < 140 mmHg.

Stoppen
Stop niet,
tenzij hinderlijke bijwerkingen.

Jeroen Bosch Huisartsen

Gebaseerd op NHG-standaard Cardiovasculair Risicomanagement 2019,
Praktische handleiding bij de NHG standaard CVRM 2019.
Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend.